



**CADERNO DE QUESTÕES
310 – Médico Psiquiatra**

Nível Superior

NOME DO CANDIDATO	No. INSCRIÇÃO	CÓD. CARGO	SALA	ORDEM
-------------------	---------------	------------	------	-------

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS

- **Confira, com máxima atenção**, o Caderno de Questões, observando o número de questões contidas e se há defeito(s) de encadernação e/ou de impressão que dificultem a leitura. Caso haja, comunique imediatamente ao fiscal de sala.
- Confira, com máxima atenção, se os dados (nome do candidato, inscrição, número do documento de identidade e cargo) constantes na Folha de Respostas estão corretos. E havendo falhas na Folha de Respostas, comunique imediatamente ao fiscal de sala.
- Use apenas caneta esferográfica azul ou preta de corpo transparente.
- **A prova terá duração máxima de 3h** (três horas): tempo para responder a todas as Questões da Prova Objetiva, preencher a Folha de Respostas e o Gabarito que faz parte desta capa.
- **Tempo mínimo de permanência em sala após início das provas: 1h30 (uma hora e trinta minutos).**
- **O Caderno de Questões somente poderá ser levado 30 (trinta) minutos antes do término do tempo determinado para a realização da prova.**
- Para cada questão de múltipla escolha, há **apenas uma resposta correta**.
- Use todos os espaços em branco do caderno de questões para rascunho.
- A Folha de Respostas **não** poderá ser dobrada, amassada ou danificada. Em hipótese alguma, será substituída.
- Assine a Folha de Respostas no espaço apropriado.
- Não ultrapasse o limite dos alvéolos no gabarito da Folha de Respostas.
- Antes de retirar-se definitivamente da sala, entregue a Folha de Respostas ao fiscal.
- A embalagem que guarda todos os aparelhos de uso não permitidos só poderá ser aberta fora do prédio de aplicação das provas.
- Até que você saia do prédio, todas as orientações continuam válidas, sendo passíveis de sanções contidas no Edital, caso não obedecidas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA – CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2024

Nome do Candidato

No. de inscrição

Respostas de 01 a 15					Respostas de 16 a 30					Respostas de 31 a 45					Respostas de 46 a 60								
01	A	B	C	D	E	16	A	B	C	D	E	31	A	B	C	D	E	46	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E	17	A	B	C	D	E	32	A	B	C	D	E	47	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E	18	A	B	C	D	E	33	A	B	C	D	E	48	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E	19	A	B	C	D	E	34	A	B	C	D	E	49	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E	20	A	B	C	D	E	35	A	B	C	D	E	50	A	B	C	D	E
06	A	B	C	D	E	21	A	B	C	D	E	36	A	B	C	D	E	51	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E	22	A	B	C	D	E	37	A	B	C	D	E	52	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E	23	A	B	C	D	E	38	A	B	C	D	E	53	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E	24	A	B	C	D	E	39	A	B	C	D	E	54	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E	25	A	B	C	D	E	40	A	B	C	D	E	55	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E	26	A	B	C	D	E	41	A	B	C	D	E	56	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E	27	A	B	C	D	E	42	A	B	C	D	E	57	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E	28	A	B	C	D	E	43	A	B	C	D	E	58	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E	29	A	B	C	D	E	44	A	B	C	D	E	59	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E	30	A	B	C	D	E	45	A	B	C	D	E	60	A	B	C	D	E

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 à 6:

Triste Bahia

Triste Bahia! ó quão dessemelhante
És da que eu vi! Já não és tu, és outra;
Em ti não vejo a mesma formosura,
Em ti não vejo o mesmo ar, a mesma altura.

Em ti não vejo os homens que vi outrora,
A mesma gente, a mesma corte, a mesma flora.
Mudou-se a terra, o céu, o clima, o povo,
E tudo quanto em ti causava espanto.

Os teus engenhos, que de açúcar eram,
Trocaram-se em canaviais de prata;
Teus lavradores, que de algodão vestiam,
Trocaram-se em mercadores de burel.

A ti trocou-te a máquina mercante,
Que em tua larga barra tem entrado;
A mim foi-me trocando, e tem trocado,
Tanto negócio e tanto negociante.

1. O poema apresenta uma crítica à sociedade baiana do século XVII. Qual é o principal alvo dessa crítica?

- a) A decadência da produção de açúcar na Bahia.
- b) A ascensão da classe mercantil e o declínio da aristocracia rural.
- c) A mudança nos costumes e valores da sociedade baiana.
- d) A exploração colonial portuguesa na Bahia.

2. O poema utiliza diversas figuras de linguagem para construir sua crítica. Identifique e explique a função de duas delas no texto.

- a) Anáfora e metáfora.
- b) Metonímia e sinestesia.
- c) Paradoxo e ironia.
- d) Prosopopeia e antonomásia.

3. O poema pode ser interpretado como uma reflexão sobre a passagem do tempo e as mudanças que ele provoca. Explique como essa temática se desenvolve no texto.

- a) Através da comparação entre a Bahia do passado e do presente.
- b) Através da descrição da decadência da economia baiana.
- c) Através da crítica à ganância e à materialização da sociedade.
- d) Através da nostalgia do poeta pelo passado idealizado.

4. No trecho “Em ti não vejo os homens que vi outrora”, a palavra em desataque pode ser substituída, sem alterar o significado do texto, por:

- a) recentemente.
- b) outrossim.
- c) igualmente.
- d) dantes.

5. Sobre a colocação pronominal em “Mudou-se a terra, o céu, o clima, o povo (...)”, temos:

- a) Uso facultativo de ênclise.
- b) Correto uso de ênclise.
- c) Incorreto uso de ênclise.
- d) Correto uso de próclise.

6. Em “E tudo quanto em ti causava espanto.”, o verbo em destaque encontra-se conjugado no:

- a) Presente do Indicativo.
- b) Pretérito Mais-que-perfeito do Indicativo.
- c) Pretérito Perfeito do Indicativo.
- d) Pretérito Imperfeito do Indicativo.

7. Em “Colocou os copos cuidadosamente na pia.” o advérbio em destaque tem valor semântico de:

- a) modo.
- b) intensidade.
- c) ordem.
- d) inclusão.

8. Complete as lacunas nas orações abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta:

- I – O policial viu a briga e logo _____.
II – O coração fica na caixa _____.
III – Os lutadores se _____ em frente a plateia.
IV – A camisa que eu queria estava na _____ de esportes.

- a) interview – torácica – degladiavam – sessão.
b) interview – torácica – digladiavam – seção.
c) interveio – torácica – degladiavam – sessão.
d) interveio – torácica – digladiavam – seção.

9. Assinale a alternativa em que há correta concordância:

- a) Fazem dez anos que eu não viajo de avião.
b) Dentro da cesta haviam cem morangos.
c) Atenção é necessário para executar um bom trabalho.
d) É proibida saída de veículos no portão principal.

10. Não há presença de um numeral em:

- a) Um pastel, por favor!
b) Primeiro as damas!
c) Um certo dia, resolvemos caminhar.
d) Fui na padaria e comprei uma torta.

MATEMÁTICA

11. Assinale a alternativa que apresenta a soma dos quadrados dos dez primeiros números naturais:

- a) 385
b) 380
c) 375
d) 370

12. Seja p e q números racionais tais que $p + q = \frac{1}{2}$ e $pq = \frac{1}{4}$. Determine o valor de $p^2 + q^2$:

- a) $\frac{1}{2}$
b) $\frac{1}{3}$
c) $\frac{1}{4}$
d) $\frac{1}{5}$

13. Uma balança de dois pratos está em equilíbrio. No prato esquerdo, há uma caixa com 3 maçãs e 2 laranjas. No prato direito, há uma caixa com 4 bananas. Se cada maçã pesa 150 gramas, cada laranja pesa 200 gramas e cada banana pesa 100 gramas, a massa total da caixa com as maçãs e laranjas equivale a

- a) 1 kg
b) 950 gramas
c) 900 gramas
d) 850 gramas

14. Um triângulo equilátero tem lado de 10 cm. Um ponto P está situado no interior do triângulo, a 3 cm de cada lado. Determine a área da maior região triangular que pode ser formada por dois lados do triângulo equilátero e o segmento de reta que liga P a um vértice do triângulo:

- a) $36\sqrt{3}cm^2$
b) $50\sqrt{3}cm^2$
c) $72\sqrt{3}cm^2$
d) $54\sqrt{3}cm^2$

15. Considere a sequência de conjuntos:

$$\begin{aligned} S_1 &= \{1\} \\ S_2 &= \{1, 2\} \\ S_3 &= \{1, 2, 3\} \\ S_4 &= \{1, 2, 3, 4\} \\ &\dots \end{aligned}$$

Qual é o número de elementos do conjunto S_{2024} ?

- a) 2024
b) 2023
c) 2022
d) 2021

16. Situação Hipotética: Um cofrinho mágico contém moedas de R\$1,00 e moedas de R\$2,00. Sabe-se que o número total de moedas disponíveis é 20 e o valor total dentro do cofrinho é R\$ 34,00. Nessas condições, há nesse cofrinho

- a) 12 moedas de R\$ 1,00 e 11 moedas de R\$ 2,00.
- b) 8 moedas de R\$ 1,00 e 13 moedas de R\$ 2,00.
- c) 10 moedas de R\$ 1,00 e 12 moedas de R\$ 2,00.
- d) 6 moedas de R\$ 1,00 e 14 moedas de R\$ 2,00.

17. A Grande Muralha da China se estende por milhares de quilômetros. Um mapa indica que 5 cm na escala do mapa correspondem a 200 km na realidade. Se a medida da muralha no mapa é de 120 cm, sua extensão real será de

- a) 5200 km.
- b) 5000 km.
- c) 4800 km.
- d) 4600 km.

18. Para pintar uma residência, uma equipe de pintores leva 5 dias se trabalhar 8 horas por dia. Se a equipe trabalhar apenas 6 horas por dia, a pintura da casa será concluída, aproximadamente, em

- a) 7 dias.
- b) 8 dias.
- c) 9 dias.
- d) 10 dias.

19. Uma nave espacial precisa alcançar uma velocidade de escape de 11,2 km/s para deixar a órbita da Terra. A nave tem uma massa inicial de 1.200 kg e seus propulsores fornecem uma aceleração constante de 3,5 m/s². Quanto tempo os propulsores precisam funcionar para que a nave alcance a velocidade de escape?

- a) 2800 segundos
- b) 3200 segundos
- c) 3600 segundos
- d) 4000 segundos

20. Um grupo de amigos está planejando uma viagem de carro de 600 km. Eles estimam que o consumo de gasolina do carro é de 1 litro para cada 10 km percorridos. Se eles querem ter autonomia para toda a viagem e ainda ter uma reserva de 10% do total de gasolina, quantos litros de gasolina eles precisam levar?

- a) 78 litros
- b) 66 litros
- c) 90 litros
- d) 84 litros

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Um paciente do sexo masculino, 35 anos, apresenta quadro depressivo grave com ideação suicida, sem histórico de resposta a antidepressivos ISRS e venlafaxina em doses adequadas. Na avaliação, observa-se agitação psicomotora e insônia grave. É a estratégia farmacoterapêutica mais adequada para este caso:

- a) Iniciar antidepressivo tricíclico (TCAs) em monoterapia.
- b) Iniciar antidepressivo inibidor da recaptção de serotonina e noradrenalina (IRSN) em monoterapia.
- c) Iniciar antidepressivo inibidor da monoaminoxidase (IMAO) em monoterapia.
- d) Adicionar antipsicótico atípico à terapia antidepressiva atual.

22. Uma paciente do sexo feminino, 25 anos, apresenta transtorno de ansiedade generalizada (TAG) com sintomas há mais de 6 meses, que interferem significativamente em sua vida pessoal e profissional. Ela já experimentou terapia cognitivo-comportamental (TCC) sem melhora significativa. É a medicação de primeira linha mais indicada para este caso:

- a) Benzodiazepínico de ação prolongada.
- b) Antidepressivo inibidor seletivo da recaptção de serotonina (ISRS).
- c) Antidepressivo inibidor da recaptção de serotonina e noradrenalina (IRSN).
- d) Antidepressivo tricíclico (TCAs) com propriedades anticolinérgicas.

23. Um paciente do sexo masculino, 60 anos, apresenta quadro de demência progressiva com alterações de comportamento, como agitação, agressividade e psicose. É a medicação mais indicada para este caso:

- a) Antidepressivo ISRS.
- b) Antipsicótico atípico.
- c) Antipsicótico típico.
- d) Benzodiazepínico de ação prolongada.

24. A respeito da estimulação unilateral não dominante na eletroconvulsoterapia (ECT), considere a alternativa correta:

- a) É o método padrão para todos os pacientes, independentemente do diagnóstico ou histórico de tratamento.
- b) É menos eficaz que a estimulação bilateral, mas apresenta menor risco de efeitos colaterais cognitivos.
- c) É contraindicada em pacientes com psicose, pois pode aumentar o risco de sintomas psicóticos.
- d) É preferida em pacientes com depressão grave que não responderam a outras formas de tratamento.

25. Dos seguintes achados de imagem cerebral, e o que está mais frequentemente associado à resposta positiva à ECT em pacientes com depressão maior:

- a) Aumento do volume do hipocampo.
- b) Redução do volume da amígdala.
- c) Aumento da conectividade funcional entre o córtex pré-frontal e o núcleo *accumbens*.
- d) Redução da assimetria do giro temporal superior.

26. A respeito dos riscos e benefícios da ECT em gestantes com transtorno bipolar, considere a alternativa correta:

- a) A ECT está contraindicada em todos os trimestres da gestação devido ao alto risco de teratogenicidade.
- b) A ECT é segura no segundo e terceiro trimestres, mas deve ser evitada no primeiro trimestre.
- c) Os riscos da ECT para o feto são mínimos, mas os benefícios para a mãe podem ser consideráveis.
- d) A decisão de realizar ECT em gestantes deve ser tomada caso a caso, após avaliação multidisciplinar e com o consentimento da paciente.

Para responder às questões de 27 a 30, considere o caso clínico, abaixo:

Paciente: João, 32 anos, solteiro, professor universitário.

- Histórico: João foi encaminhado ao consultório de psiquiatria por um colega após apresentar episódios alternados de euforia e depressão acentuada nos últimos 12 meses. Durante os episódios de euforia, João demonstrava grande energia, falava rapidamente sobre muitos projetos futuros, e relatava necessitar de poucas horas de sono. Além disso, envolveu-se em várias atividades de risco, incluindo gastos excessivos e comportamento sexual imprudente. Após algumas semanas, sua disposição mudava drasticamente para um estado de depressão, onde ele se isolava, expressava sentimentos de inutilidade e desesperança, e apresentava dificuldade significativa para realizar suas atividades diárias. Em duas ocasiões, João teve pensamentos suicidas, levando a internações breves. Não há histórico de uso de substâncias ilícitas ou condições médicas relevantes. Sua mãe foi diagnosticada com transtorno bipolar tipo I na juventude.

- Exame físico e testes laboratoriais: Sem anormalidades.
- Diagnóstico: Transtorno Bipolar Tipo I.

27. É mecanismo neurobiológico que está mais consistentemente implicado no desenvolvimento do transtorno bipolar tipo I:

- a) Alteração no transporte de glutamato nos neurônios corticais.
- b) Disfunção dos canais de sódio dependentes de voltagem.
- c) Redução da atividade da monoaminoxidase no sistema límbico.
- d) Desregulação da via de sinalização do fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF).

28. Das seguintes estratégias de tratamento, é a recomendada como linha de frente no manejo do transtorno bipolar tipo I para prevenir episódios maníacos:

- a) Terapia cognitivo-comportamental focada exclusivamente em sintomas depressivos.
- b) Uso de antipsicóticos atípicos como monoterapia.
- c) Uso de estabilizadores de humor, como o lítio ou valproato.
- d) Psicoeducação familiar sem suporte farmacológico.

29. É o biomarcador considerado promissor para o diagnóstico diferencial do transtorno bipolar tipo I em relação à depressão unipolar:

- a) Níveis plasmáticos de cortisol matinal.
- b) Assinatura de expressão gênica de células imunes periféricas.
- c) Concentração de ácido valpróico no soro.
- d) Níveis séricos de vitamina D.

30. Em relação ao prognóstico do transtorno bipolar tipo I, é afirmação verdadeira:

- a) A maioria dos pacientes apresenta remissão completa dos sintomas com o tratamento inicial.
- b) Episódios depressivos são menos comuns, mas tendem a ser mais curtos do que episódios maníacos.
- c) Pacientes com início precoce da doença têm melhor prognóstico devido à maior resposta ao tratamento.
- d) Um histórico familiar de transtorno bipolar está associado a um curso mais grave da doença.

Para responder às questões de 31 a 34, considere o caso clínico, abaixo:

Histórico do Paciente:

João, 28 anos, solteiro, apresentou-se ao consultório acompanhado por familiares, relatando percepções auditivas de vozes que comentavam suas ações e conspiravam contra ele. Descreveu crenças de estar sendo constantemente vigiado por dispositivos implantados em seu corpo e monitorado por uma organização secreta. Negou uso de substâncias psicoativas. Seu desempenho no trabalho e as relações interpessoais deterioraram-se significativamente nos últimos seis meses. Não há histórico familiar de transtornos psiquiátricos. Exame físico e exames laboratoriais não evidenciaram anormalidades. A avaliação psiquiátrica revelou um estado de consciência claro, orientação no tempo e espaço preservada, mas com pensamento delirante organizado em torno de perseguição e referência, além de alucinações auditivas.

31. É o mecanismo de ação mais provável dos antipsicóticos de segunda geração, que justifica sua eficácia no tratamento da esquizofrenia paranoide:

- a) Bloqueio dos receptores D2 de dopamina e um efeito adicional nos receptores de serotonina, equilibrando os sintomas positivos e negativos.
- b) Bloqueio dos receptores D2 de dopamina, reduzindo principalmente os sintomas positivos.
- c) Bloqueio dos receptores de serotonina, sem efeito sobre os receptores de dopamina.
- d) Aumento da liberação de GABA no sistema nervoso central.

32. Dos seguintes achados, é o esperado na ressonância magnética (RM) de um paciente com esquizofrenia paranoide:

- a) Aumento do volume ventricular lateral.
- b) Hipertrofia do hipocampo.
- c) Diminuição da espessura cortical frontal.
- d) Aumento da substância branca periventricular.

33. É a estratégia de tratamento recomendada para pacientes com esquizofrenia paranoide que não respondem adequadamente aos antipsicóticos de segunda geração:

- a) Início de um antipsicótico de primeira geração.
- b) Adição de um antidepressivo SSRIs (inibidores seletivos da recaptção de serotonina).
- c) Clozapina, devido à sua eficácia em pacientes refratários a outros tratamentos.
- d) Terapia cognitivo-comportamental exclusivamente, sem uso de medicamentos.

34. NÃO é caracteristicamente associado à esquizofrenia paranoide:

- a) Alucinações visuais complexas.
- b) Delírios de grandeza.
- c) Afeto achatado.
- d) Comportamento catatônico.

35. Um indivíduo do sexo masculino, 35 anos, é acusado de homicídio. A defesa alega inimputabilidade por insanidade mental. O laudo pericial psiquiátrico conclui que o réu apresentava transtorno delirante persistente no momento do crime. O principal fator que o juiz deve considerar ao decidir sobre a inimputabilidade do réu é:

- a) A gravidade do crime cometido.
- b) A presença de sintomas psicóticos no momento do crime.
- c) O histórico de internações psiquiátricas do réu.
- d) A capacidade do réu de entender a ilicitude do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento.

36. Uma mulher de 40 anos é encaminhada para avaliação psiquiátrica forense após apresentar comportamento violento e ameaçador contra seus familiares. Ela relata ter sido vítima de abuso sexual na infância. É o instrumento de avaliação mais adequado para avaliar o risco de reincidência de violência no caso dessa mulher:

- a) Escala de Avaliação de Risco de Violência (HCR-20).
- b) Entrevista de Avaliação de Risco de Violência (VRAG).
- c) Teste de Personalidade Multifásico de Minnesota (MMPI-2).
- d) Inventário de Depressão de Beck (BDI).

37. Um adolescente de 17 anos é apreendido por tráfico de drogas. A avaliação psiquiátrica revela que ele apresenta transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e transtorno de conduta. É a medida judicial mais adequada para o caso desse adolescente:

- a) Internação em hospital psiquiátrico.
- b) Aplicação de medida socioeducativa em regime fechado.
- c) Aplicação de medida socioeducativa em regime semiaberto.
- d) Liberdade assistida.

38. Qual das seguintes afirmações sobre o diagnóstico de parafilia é a mais precisa?

- a) Parafilias são transtornos mentais que requerem tratamento com medicações antipsicóticas.
- b) A mera presença de uma parafilia, sem sofrimento ou prejuízo significativo na vida do indivíduo, configura um transtorno mental.
- c) Parafilias são sempre indicativas de um passado traumático ou abuso sexual na infância.
- d) O diagnóstico de parafilia depende da avaliação criteriosa de um profissional de saúde mental, considerando diversos fatores, como a frequência, intensidade e impacto na vida do indivíduo.

39. A respeito do tratamento das parafilias, indique a alternativa correta:

- a) A terapia de dessensibilização sistemática é contraindicada em todos os casos de parafilia.
- b) A medicação não tem papel no tratamento das parafilias, sendo a terapia a única opção eficaz.
- c) A abordagem terapêutica para as parafilias deve ser individualizada e multimodal, podendo incluir psicoterapia, terapia comportamental e, em alguns casos, medicação.
- d) A internação psiquiátrica é sempre necessária para o tratamento eficaz das parafilias.

40. Dos seguintes instrumentos de avaliação, é considerado o padrão ouro para o diagnóstico de parafilias:

- a) Inventário Multifásico de Personalidade de Minnesota (MMPI).
- b) Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5).
- c) Escala de Inteligência Wechsler para Adultos (WAIS).
- d) Teste de Rorschach.